

Nova combinação em Deltocephalinae (Hemiptera, Cicadellidae)¹

Keti Maria Rocha Zanol^{2,3}

¹Contribuição nº 1476 do Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Paraná.

²Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Paraná. Caixa Postal 19020, 81531-980 Curitiba-PR, Brasil.

³Bolsista do CNPq.

ABSTRACT. New combination in Deltocephalinae (Hemiptera, Cicadellidae). A new combination is established: *Eusceloidea delongi* (Zanol, 1996) **comb. nov.** (formerly in *Frequenamia*). The species is redescribed and illustrated.

KEYWORDS. Cicadellidae; Deltocephalinae; *Eusceloidea*; Hemiptera.

RESUMO. Uma nova combinação é proposta: *Eusceloidea delongi* (Zanol, 1996) **comb. nov.** (antes em *Frequenamia*). Redescrição e ilustração da espécie são dadas.

PALAVRAS-CHAVE. Cicadellidae; Deltocephalinae; *Eusceloidea*; Hemiptera.

Eusceloidea delongi (Zanol, 1996) **comb. nov.** (Figs. 1-9)

Frequenamia atrata Delong, 1984:119 (*praeoc.*)

Frequenamia delongi Zanol, 1996 (novo nome para *Frequenamia atrata* Delong, 1984).

Coroa marrom-avermelhada margeada de preto. Face marrom-escura. Frontoclípeo, uma faixa transversa abaixo dos olhos e arcos laterais marrom-avermelhados. Pronoto preto com manchas amareladas e marrom-avermelhadas. Asas anteriores semitransparentes, marrom-escuras, com áreas despigmentadas.

Cabeça inclinada anteriormente, mais larga que o pronoto. Coroa arredondada, de comprimento uniforme. Margem anterior com quatro carenas transversais, mais ou menos paralelas, sendo duas acima dos ocelos e duas abaixo. Ocelos na margem anterior não visíveis de cima. Distância ocelo-ocular menor que o diâmetro dos ocelos. Sutura coronal ultrapassando a metade do comprimento da coroa. Frontoclípeo túmido co superfície rugosa até a altura dos alvéolos antenais e depois plano e microesculturada. Anticlípeo de lados paralelos. Genas sinuosas com leve reentrância abaixo dos olhos.

Pronoto inclinado anteriormente. Asas anteriores com duas células anteapicais fechadas; a externa menor que a central; 1ª e 2ª células apicais grandes. Clavo com venação obscura. Apêndice desenvolvido, alcançando a M₃₊₄.

Pigóforo sem apêndices. Valva genital triangular. Placas subgenitais triangulares; poucas macrocerdas unisseriadas. Estilos falciformes; ápice oblíquo truncado. Edeago curvo

para cima; ápice bífido com braços divergentes. Gonópore apical. Conetivo em forma de Y.

Comprimento. 4,0 mm.

Fêmea. Desconhecida.


Material examinado. Holótipo. *Frequenamia atrata* DeLong, 1984. (Ohio State University).

Comentário. DELONG (1984) descreveu a espécie no gênero *Frequenamia*, porém, as características que apresenta, tais como: a cabeça e pronoto inclinados anteriormente; coroa arredondada e comprimento uniforme; frontoclípeo fortemente túmido; e a 1ª e 2ª células apicais bem maiores do que as demais, são próprias de *Eusceloidea*, motivo pelo qual a transferimos para este gênero.

A cápsula genital encontra-se bastante danificada e com restos de musculatura.

REFERÊNCIAS

- DELONG, D. M. 1984. New leafhoppers of the "Bahita" group (Homoptera: Cicadellidae: Deltocephalinae) from Central and South America. **Brenesia** 22: 115-122.
- ZANOL, K. M. R. 1996. Homonymy within *Frequenamia* DeLong (Homoptera, Cicadellidae, Deltocephalinae). **Revista Brasileira de Zoologia** (13)(13): 813.



Figs. 1-9. *Eusceloidea delongi* (Zanol, 1996). 1, cabeça e pronoto, dorsal; 2, margem anterior da coroa; 3, cabeça e pronoto, lateral; 4, asa anterior; 5, pigóforo, lateral; 6, valva genital, placa subgenital e estilo; 7, edeago, ventral; 8, conetivo e edeago, lateral; 9, valva genital, placa subgenital e estilo.

Recebido em 16.II.2004; aceito em 15.VIII.2004